

# Medicarine

## Fertőtlenítő tabletták

- Széles hatásspektrum
- Aktív klórt tartalmaz
- Tojásfertőtlenítésre is
- Alacsony koncentráció az alkalmazás során
- Minden egészségügyi intézményben alkalmazható

### Alkalmazási terület:

Betegellátó intézményekben, élelmiszeriparban mosható fal- és padlóburkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak, klóráló eszközök, felületek fertőtlenítésére.

### Felhasználási javaslat:

Szerves anyaggal nem szennyezett felületen a készítményből X tablettát kell feloldani vízben. A szerves anyaggal szennyezett felület fertőtlenítésére a készítményből X tablettát kell feloldani vízben. Kiömlött vért, váladékot hatóanyagtartalmú oldattal kell leönteni és 15 perc után egyszer használatos törülközővel feltörölni. Élelmiszeriparban a fertőtlenítési idő letelte után az élelmiszerrel érintkező felületeket és az eszközöket minden esetben ivóvíz minőségű vízzel alaposan le kell öblíteni. Élelmiszeriparban a fertőtlenítési idő letelte után a tyúktojást ivóvíz minőségű vízzel alaposan le kell öblíteni.

### Tárolás :

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, 40°C alatti, jól szellőztethető száraz helyiségben, savaktól elkülönítve 1 évig.

### Összetétel:

Nátrium-NN-diklórizocianurát. Minden (2,72 g tömegű) tabletták 1,5 aktív klórt tartalmaz.

### Kémiai-fizikai adatok:

<b>Relatív sűrűség</b>	nem alkalmazható
<b>PH-érték</b>	7,0 (10 g/l-es oldat 20 °C-on)
<b>Oldhatóság</b>	vízzel oldható (20 °C-on)
<b>Halmazállapot</b>	tabletták

### Kiszereles:

<b>Csomagolás</b>	<b>Cikkszám</b>
6 x 300 db	3222

### Veszély jele:

C - maró  
nem tűzveszélyes és nem éghető termék („E” tűzveszélyességi osztály).

